

# Overzicht chronische aandoeningen fysiotherapie

Alleen uw fysiotherapeut bepaalt of uw aandoening op de speciale lijst met chronische ziektes staat.

## Aandoeningen aan het zenuwstelsel

- Cerebrovasculair accident
- Ruggemergaandoening
- Multipele sclerose
- Perifere zenuwaandoening als sprake is van motorische uitval
- Extrapiramidale aandoening
- Motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij/zij is jonger dan 17 jaar
- Aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel (duur van de behandeling is maximaal 2 jaar, na bestraling)
- Cerebellaire aandoening
- Uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel
- Radiculair syndroom met motorische uitval (duur van de behandeling is maximaal 3 maanden)
- Spierziekte
- Myasthenia gravis.

## Aandoeningen aan het bewegingsapparaat

- Aangeboren afwijking
- Progressieve scoliose
- Juvenile osteochondrose en hij/zij is jonger dan 22 jaar
- Reflexdystrofie
- Fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget
- Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) (duur van de behandeling is maximaal 12 maanden)
- Hyperostotische spondylose (morbus Forestier)
- Collageenziekten
- Status na amputatie
- Whiplash (duur van de behandeling is maximaal 3 maanden, soms verlengd met zes maanden)
- Postpartum bekkeninstabiliteit (duur van de behandeling is maximaal 3 maanden)
- Fracturen als deze conservatief worden behandeld (duur van de behandeling maximaal 6 maanden na conservatieve behandeling).

## Overige aandoeningen

- Aangeboren afwijking van de tractus respiratorius
- Lymfoedeem
- Littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma
- Status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling (duur van de behandeling is maximaal 12 maanden na ontslag)
- Perifeer arterieel vaatlijden in stadium 3 Fontaine (duur van de behandeling is maximaal 12 maanden)
- Weke delen tumoren
- Diffuse interstitiële longaandoening als sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis.